

ÁCAROS SOBRE LOS QUE TIENE EFECTO MILBEKNOCK®

Tetranychidae	Eriophyidae	Tarsonemidae
<i>Panonychus citri</i>	<i>Aculops pelekassi</i>	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>
<i>Panonychus ulmi</i>	<i>Aculus schlechtendali</i>	<i>Phytanemus pallidus</i>
<i>Tetranychus urticae</i>	<i>Epitrimerus pyri</i>	<i>Phyllocoptrutta oleivora</i>
<i>Tetranychus turkestani</i>	<i>Eriophes sheldoni</i>	
<i>Tetranychus cinnabarinus</i>		

CULTIVOS AUTORIZADOS


FRESA



Contra	Dosis (ml/ha)	Modo de empleo
Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>) (<i>Panonychus ulmi</i>)	125-150 máximo 900 ml/ha	Tratar al inicio de la infestación. Efectuando como máximo 2 tratamientos por campaña.

PLAZO DE SEGURIDAD: 1 día

MANZANO



Contra	Dosis (ml/ha)	Modo de empleo
Araña roja (<i>Panonychus ulmi</i>) (<i>Tetranychus urticae</i>)	100-150 gasto de 1000 l/ha de caldo	Se puede aplicar a partir de final de caída de pétalos. Variedades Grupo Golden: Deberá tenerse la precaución de evitar tratar en periodos previos de humedad prolongada y contraste térmico (debe transcurrir más de 1 semana entre tratamiento y condiciones climáticas adversas).

PLAZO DE SEGURIDAD: 14 días

ROSAL Y ORNAMENTALES HERBÁCEAS



Contra	Dosis (ml/ha)	Modo de empleo
Araña roja (<i>Panonychus ulmi</i>) (<i>Tetranychus urticae</i>)	125-150	Tratar al inicio de la infestación. Efectuando como máximo 2 tratamientos por campaña.

PLAZO DE SEGURIDAD: No procede



Presentación:

250 cc; (24 u./ caja)

1 lit; (12 lit./ caja)

Producto y marca de:



SANKYO COMPANY Ltd. (Japón)

Distribuido por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 BARCELONA (España)
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02
E-mail: masso@cqm.es - www.massoaagro.com



MILBEKNOCK®

ACARICIDA
DE ALTO
EFECTO DE
CHOQUE

